

بريب (PREP)

امنع بشكل فعال حدوث الإصابة
بالعدوى بفيروس نقص المناعة
البشرية (HIV)

hivpoint.fi/prep



الضوابط والنظم المتوجب أن يتذكرها مستخدم دواء بريب

- لقد ذهبت لإجراء اختبار بريب، وأنت غير مُصاب بفيروس نقص المناعة البشرية
- علاجك بدواء بريب يتم من خلال متابعة الطبيب وسوف تذهب عند الحاجة لإجراء فحوصات مخبرية، مع الالتزام بزيارة الطبيب كل ٣ اشهر
- تستطيع الالتزام بدواء بريب.
- بريب لا يوفر الوقاية لك ضد الأمراض الجنسية الأخرى.

بدء استخدام بريب والمتابعة

- تقييم الطبيب بشأن الحاجة إلى بريب
- اختبار فيروس نقص المناعة البشرية (HivAgAb) واختبارات الأمراض الجنسية الأخرى كل ثلاثة أشهر
- تتم متابعة عمل الكليتين أثناء فترة العلاج (اختبار كرياتينين)
- من الممكن الحصول على وصفة الطبيب لدواء بريب لمدة ثلاثة أشهر في كل مرة

كيف أحصل على بريب؟

هناك توصية وطنية بشأن استخدام دواء بريب. من الممكن أن يصف دواء بريب الطبيب المطلع على علاج فيروس نقص المناعة البشرية. من الجدير بالذكر ان بدء العلاج بدواء بريب والمتابعة والحصول على الدواء مجاناً من قبل دائرة الرعاية الصحية الفنلندية.



@CHECKPOINTFINLAND

hivpoint.fi/prep

إذا كانت لديك أية أسئلة أو استفسارات عن دواء بريب، الرجال
التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني ادناه.
prep@hivpoint.fi

hivpoint

Know your status.

CHECKPOINT

@hivpoint

9/2021






8



كيف يُستخدم بريب؟

الطريقة الأكثر شيوعًا للعلاج بالدواء هي من خلال أخذ حبة واحدة يوميًا في نفس الوقت.

من الممكن استخدام بريب أيضًا عند الحاجة) حسب الطلب on-demand (حيث يتم حينئذ أخذ حبتين مرة واحدة - 2 - 42 ساعة قبل ممارسة الجنس، ومواصلة ذلك من خلال أخذ حبة واحدة يوميًا. يتم أخذ الدواء مرتين بعد ممارسة الجنس آخر مرة، بعد ذلك من الممكن إيقافه.



ما هو بريب (PREP)؟

بريب (pre-exposure prophylaxis) عبارة عن دواء للوقاية من الإصابة بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV). عند استعمال بريب بشكل صحيح، يكون وسيلة فعالة جداً للوقاية من الإصابة بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية. بريب لا يوفر الوقاية ضد الأمراض الجنسية الأخرى.

لمن بريب مُخصص؟

بريب مُخصص للوقاية من الإصابة بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية لأولئك الأشخاص المعرضين لخطر كبير للإصابة بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية. من الممكن أن يكون الخطر كبيراً، إذا كان يتم ممارسة الجنس من خلال فتحة الشرج بدون عازل ذكري، مع الشركاء العشوائيين لممارسة الجنس، أو عند ممارسة الجنس بشكل جماعي.

ليست هناك حاجة لاستخدام بريب إذا كان الشريك مُصاباً بفيروس نقص المناعة البشرية ولديه دواء فعال لفيروس نقص المناعة البشرية (من غير الممكن انتقال الفيروسات) حيث من غير الممكن أن تنتقل الإصابة بالعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية من شخص لديه دواء فعال لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية حتى أثناء ممارسة الجنس من خلال فتحة الشرج دون استخدام العازل الذكري.