


PEP - HIVIN JÄLKIEHKÄISYLÄÄKE



PEP (Post-Exposure Prophylaxis)

Lääkäri voi määrätä hivin jälkiehkäisy-lääkityksen käytettäväksi tilanteissa, joissa on kohonnut riski saada hiv-tartunta. PEP-lääkitys tulee aloittaa 72 tunnin sisällä suojaamattoman yhdynnän jälkeen. Mitä aiemmin lääkitys aloitetaan, sitä paremmin se suojaa. PEP-lääkityksen kesto on neljä viikkoa. PEP-lääkityksen tarpeen arvioi sairaaloiden yhteispäivystyksen lääkäri.

Lääkitty hiv ei tartu

Toimivalla lääkityksellä oleva hiv-positiivinen henkilö ei tartuta hiviä edes anaali- tai emätinyhdynnässä ilman kondomia.

Pienen hiv-riskin tilanteet

PEP-lääkitystä ei aloiteta pienen hiv-riskin tilanteissa, kuten suojaamattoman suuseksin jälkeen.

Hiv-testaus PEP-lääkityksen aikana

- Ennen PEP-lääkityksen aloitusta
- PEP-lääkityksen lopussa
- Neljä kuukautta altistuksesta

Kansallinen PEP-ohjeistus
löytyy kokonaisuudessaan:
arvosta.fi

hivpoint.fi

hiv|point