


Testaa seksitaudit oikein, oikeista paikoista ja oikeaan aikaan



Testit seksitavan mukaan

Milloin testi otetaan?

Miten testi otetaan?

<p>Hiv emätinyhdyntä, anaaliyhdyntä, suuseksissä hiv-riski on erittäin alhainen ja ainoastaan sillä osapuolella, joka saa suuhunsa siemennestettä tai emätineritettä</p>	3-4 viikkoa (*3kk)	Suoniverinäyte kyynärtaipeesta Pikatesti: verinäyte sormenpästä (josta on olemassa myös kotitesti)
<p>Kuppa emätinyhdyntä, anaaliyhdyntä, suuseksi, peräaukon nuoleminen</p>	3-4 viikkoa (**1.5kk)	Suoniverinäyte kyynärtaipeesta Pikatesti: verinäyte sormenpästä
<p>Klamydia ja tippuri: emätinyhdyntä, anaaliyhdyntä: sisään työntyvä osapuoli, suuseksi: osapuoli, jonka sukuelimiä nuollaan/imetään/hyvällään suulla</p> <p>anaaliyhdyntä: osapuoli, jonka peräaukkoon työnnytään peräaukon nuoleminen: osapuoli, jonka peräaukkoa nuollaan suulla</p> <p>suuseksi: osapuoli, joka hyväilee suulla kumppanin sukuelimiä / peräaukkoa</p>	5 vuorokautta	ensivirtsaa, emättimen, kohdunkaulan tai virtsaputken limakalvo tikkunäyte peräaukon limakalvolta tikkunäyte nielun limakalvolta

*hivin poissulkemiseksi näyte tulee tarkistaa vielä 3 kk riskitilanteen jälkeen

** kupan poissulkemiseksi näyte tulee tarkistaa vielä 1.5 kk riskitilanteen jälkeen