

كيف لا تنتقل الإصابة بعدوى فيروس المناعة البشرية؟

لا تنتقل عدوى فيروس نقص المناعة
البشرية عندما يكون الشخص المصاب
بالفيروس يخضع للعلاج بمضادات
الفيروسات القهقرية.



المعاينة



المصافحة



PrEP = دواء للوقاية من المرض قبل التعرض
للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية
PEP = العلاج الوقائي بعد التعرض لفيروس
نقص المناعة البشرية




الأسطح



التقبيل، ملامسة الجلد



السعال



لسعة الحشرات

كيفية انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية؟

تنتقل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية
فقط عندما لا يتناول الشخص الحامل
للفيروس مضادات الفيروسات القهقرية.



عن طريق الجماع المهبلي والشرجي
بدون واقي ذكري

تكون نسبة الإصابة بالعدوى
منخفضة جداً عند ممارسة الجنس عن
طريق الفم إذا انتهى الأمر بالسائل
المنوي أو السوائل المهبلية في الفم



عند تعاطي المخدرات و
استخدام معدات حقن مستعملة



“أثناء فترة الحمل أو الولادة أو
الرضاعة، عندما لا تتناول المرأة
الحامل دواء فيروس نقص المناعة
البشرية.”

“كيفية منع الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية؟”



« استخدام الواقي الذكري ومادة تسهيل الانزلاق

استعمال أدوية الوقاية التي تحمي من الإصابة بعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية • استخدام معدات حقن نظيفة عند تعاطي المخدرات

لا يمكن تحديد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية على أساس الأعراض. قم بالاختبار!

يجب عليك القيام باختبار فيروس نقص المناعة البشرية إذا كنت قد مارست الجماع المهبلي أو الشرجي بدون واقي ذكري.

يمكنك إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية مجاناً في مركز الرعاية الصحية التابع له.

يمكنك إجراء اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بعد ٣ أسابيع من ممارسة الجنس بدون واقٍ. تُعتبر النتيجة السلبية مؤكدة بعد ١٢ أسبوعاً.



maailmanaidspaiva.org, hivpoint.fi, positiiviset.fi