

Comment le VIH ne se transmet pas ?

Il n'y a pas de transmission du VIH lorsque la personne séropositive est sous traitement antirétroviral.



◆ en faisant des câlins



◆ en serrant la main



- ◆ PrEP = médicament de préexposition pour éviter une infection par le VIH
- ◆ PEP = médicament post-exposition pour éviter une infection par le VIH




◆ les surfaces



◆ en embrassant, par contact de la peau



◆ la toux



◆ la piqûre d'insecte

Comment le VIH se transmet-il ?

Il n'y a pas de transmission du VIH lorsque la personne séropositive est sous traitement antirétroviral.



- ◆ par les rapports sexuels vaginaux et anaux sans préservatif
- ◆ le risque d'infection est très faible lors du sexe oral si le sperme ou les fluides vaginaux finissent dans la bouche



- ◆ par l'injection de drogue lors d'un partage de seringue



- ◆ pendant la grossesse, l'accouchement ou l'allaitement lorsque la femme enceinte n'est pas sous traitement anti-VIH

Comment une infection par le VIH peut-elle être évitée ?



- ◆ Par l'utilisation de préservatifs et de lubrifiant
- ◆ À l'aide d'un médicament de préexposition pour éviter une infection par le VIH
- ◆ En utilisant de matériel d'injection propre lors de l'injection de drogues

Une infection par le VIH ne peut être déterminée sur base de symptômes. Faites le test !

- ◆ Vous devez faire le test du VIH si vous avez eu des rapports vaginaux ou anaux sans préservatif.
- ◆ Vous pouvez faire le test du VIH gratuitement dans votre centre de santé local.
- ◆ Vous pouvez faire le test du VIH trois semaines après avoir eu des rapports non protégés. Un résultat négatif est fiable après 12 semaines.



maailmanaidspaiva.org, hivpoint.fi, positiiviset.fi