

วิธีใดบ้างที่ไม่ทำให้เกิดการแพร่เชื้อเอชไอวี

ไม่สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีถึงกันได้
ได้ในกรณีที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้น
ได้รับยาต้านเชื้อเอชไอวี



◆ การกอด



◆ การจับมือทักทาย



◆ PrEP = PrEP = ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสโรค

◆ PEP = ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีหลังการสัมผัสโรค




◆ พื้นผิวต่าง ๆ



◆ การจูบ สัมผัสผิวกาย



◆ การไอ



◆ การถูกแมลงสัตว์กัดต่อย

วิธีใดบ้างที่สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีได้

สามารถแพร่เชื้อเอชไอวีได้เฉพาะ
กรณีกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้นไม่ได้รับยา
ต้านเชื้อเอชไอวีเท่านั้น



- ◆ การร่วมเพศทางช่องคลอดและทางทวารหนักโดยไม่สวมถุงยางอนามัย
- ◆ ความเสี่ยงในการติดเชื้อด้วยการร่วมเพศทางปากต่ำมาก หากอสุจิหรือของเหลวจากช่องคลอดเข้าไปในปาก



- ◆ ผ่านทางการใช้อุปกรณ์ฉีดยาเสพติดร่วมกัน



- ◆ ระหว่างการตั้งครรภ์ การคลอดบุตร หรือการให้นมบุตร ขณะที่หญิงมีครรภ์นั้นไม่ได้รับยาต้านเชื้อเอชไอวี

สามารถป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวีได้ด้วยวิธีใดบ้าง



- ◆สวมถุงยางอนามัยและใช้สารหล่อลื่น
- ◆รับประทานยา PrEP เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
- ◆การใช้อุปกรณ์ในการฉีดยาที่สะอาด เมื่อใช้ยาเสพติด

หากคุณไม่สามารถระบุงการติดเชื้อเอชไอวีตามอาการได้ มาเริ่มการตรวจหาเชื้อกันเถอะ!

- ◆ คุณควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ในกรณีที่คุณเคยร่วมเพศทางช่องคลอดหรือทางทวารหนักโดยไม่สวมถุงอนามัย
- ◆ คุณสามารถขอรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรีจากศูนย์บริการสุขภาพในพื้นที่ของคุณ
- ◆ คุณสามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ภายในสามสัปดาห์หลังจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกัน โดยผลเลือดที่เป็นลบนั้นจะเป็นผลที่เชื่อถือได้หลังจากผ่านไป 12 สัปดาห์



maailmanaidspaiva.org, hivpoint.fi, positiiviset.fi