

## PREPIN ALOITUS JA SEURANTA

- Lääkärin tekemä prepin tarpeen arviointi
- Hiv-testi (HivAgAb) ja muut seksitautitestit kolmen kuukauden välein
- Munuaisten toimintaa seurataan hoidon aikana (Kreatiniinitesti)
- Prep-reseptin voi saada kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan

## MITEN SAAN PREPIÄ?

Prepin käytöstä on olemassa kansallinen suositus. Prep-lääkityksen voi määrätä hiv-hoitoon perehtynyt lääkäri. Julkisessa terveydenhuollossa prep-hoidon aloitus, seuranta ja lääkkeet ovat maksuttomia.

## MUISTISÄÄNNÖT PREPIN KÄYTTÄJÄLLE

- Olet käynyt hiv-testissä ja sinulla ei ole hiv-tartuntaa
- Prep-hoitosi tapahtuu lääkärin valvonnassa ja käyt tarvittavissa laboratorionkokeissa
- Pystyt sitoutumaan prep-lääkitykseen
- Prep ei suojaa sinua muilta seksitaudeilta



@HIVPOINT

[hivpoint.fi/prep](https://hivpoint.fi/prep)

Prepiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä:


[prep@hivpoint.fi](mailto:prep@hivpoint.fi)

hivpoint

# PREP

Estää tehokkaasti  
hiv-tartunnan

[hivpoint.fi/prep](https://hivpoint.fi/prep)



## MIKÄ ON PREP?

Prep (pre-exposure prophylaxis) on hiv-tartuntaa ehkäisevä lääkitys. Prep on oikein käytettynä erittäin tehokas hivin ennaltaehkäisykeino. Prep ei suojaa muilta seksitaudeilta.

## KENELLE PREP ON TARKOITETTU?

Prep on tarkoitettu hivin ennaltaehkäisyyn henkilöille, joilla on korkea riski saada hiv-tartunta. Riski voi olla korkea, jos on anaaliyhdyntöjä ilman kondomia useiden satunnaisten seksipartnereiden kanssa tai ryhmäseksiä.

Prepiä ei tarvitse käyttää, jos partneri on hiv-tartunnan saanut ja toimivalla hiv-lääkityksellä (virukset mittaamattomissa). Hiv ei tartu henkilöltä, joka on toimivalla hiv-lääkityksellä edes anaaliyhdyntäessä, jossa ei käytetä kondomia.



## MITEN PREPIÄ KÄYTETÄÄN?

Yleisimmin lääkehoito toteutetaan ottamalla yksi tabletti joka päivä samaan aikaan.

Prepiä voi käyttää myös tarvittaessa (on-demand), jolloin otetaan kaksi tablettia kerralla 2–24 tuntia ennen seksitilannetta ja jatketaan yhden tabletin ottamista päivittäin. Viimeisen seksikerran jälkeen lääke otetaan vielä kaksi kertaa, jonka jälkeen sen voi lopettaa. Tarpeenmukaisen käytön teho on osoitettu vain cismiehillä.

