

## НАЧАЛО ПРИЕМА ПРЕП И НАБЛЮДЕНИЕ

- Оценка врачом необходимости приема препарата
- Тест на ВИЧ (HivAgAb) и тесты на другие заболевания, передающиеся половым путем, через каждые три месяца
- На протяжении всей терапии проверяется функция почек (креатининовый тест)
- На одном рецепте выписывается количество препарата ПРЕП, необходимое на три месяца

## КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРЕП?

Существует национальная рекомендация по использованию ПРЕП. Лечение препаратом ПРЕП может быть назначено врачом, имеющим опыт лечения ВИЧ. В учреждениях общественного здравоохранения начало лечения препаратами ПРЕП, последующее наблюдение и сами препараты предоставляются бесплатно.

## ПАМЯТКА ДЛЯ ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ ПРЕП

- Вы прошли тестирование на ВИЧ, и у вас нет ВИЧ-инфекции
- Ваше лечение ПРЕП проходит под наблюдением врача, и вы сдаете необходимые лабораторные анализы
- Вы в состоянии взять на себя обязательство принимать ПРЕП
- ПРЕП не защищает вас от других заболеваний, передающихся половым путем.



@HIVPOINT

[hivpoint.fi/prep](https://hivpoint.fi/prep)

По вопросам, связанным с ПрЕП, пожалуйста, обращайтесь по адресу:

[prep@hivpoint.fi](mailto:prep@hivpoint.fi)

hivpoint

# PREP (ПРЕП)

Эффективно  
предотвращает  
заражение ВИЧ

[hivpoint.fi/prep](https://hivpoint.fi/prep)



## ЧТО ТАКОЕ ПРЕП?

ПрЕП (предэкспозиционная профилактика) — это профилактический прием антиретровирусных препаратов с целью снижения риска заражения ВИЧ. При правильном использовании ПрЕП является очень эффективным средством профилактики ВИЧ. ПрЕП не защищает от других заболеваний, передающихся половым путем.

## ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕП?

ПрЕП предназначен для профилактики ВИЧ у лиц с высоким риском заражения этим вирусом. Высокий риск может быть у лиц, практикующих анальный секс с несколькими случайными половыми партнерами или групповой секс без использования презерватива.

ПрЕП не нужно использовать, если партнер имеет ВИЧ-положительный статус и принимает эффективные препараты для лечения ВИЧ (при достижении вирусной супрессии). ВИЧ не передается от человека, принимающего эффективные препараты для лечения ВИЧ, даже во время анального секса без использования презерватива.



## КАК ПРИНИМАТЬ ПРЕП?

Чаще всего препарат принимают по одной таблетке каждый день в одно и то же время.

При необходимости также можно принять две таблетки препарата ПрЕП за 2–24 часа до предполагаемого полового контакта, после чего продолжить принимать по одной таблетке в день. После последнего полового контакта препарат принимают еще два раза, затем прием можно прекратить. Эффективность целевого применения препарата доказана только у трансгендерных мужчин.

