



SEKSITAUDIT

Seksitaudit ovat infektioita, jotka tarttuvat seksin välityksellä.

Seksitaudit voivat tarttua emätin- tai anaaliyhdyntäessä, suuseksissä tai peräaukon nuolemisen yhteydessä, kun kondomi tai suuseksisuoja ei ole käytössä.


Mitä on hyvä tietää seksitaudeista?

- Seksitaudit ovat hyvin yleisiä. Suomessa arviolta 30 000 ihmistä vuodessa saa seksitaudin.
- Kaikkien seksitautien oireita voidaan hoitaa.
- Suurimmasta osasta seksitaudeista voi parantua kokonaan.
- Seksitautien testaus ja hoito on Suomessa maksutonta julkisessa terveydenhuollossa, lukuun ottamatta herpesen ja kondylooman hoitoa.

**Seksitaudit voivat olla oireettomia.
Käy testeissä, jos sinulla on ollut riski saada tartunta.**

Miten seksitauteja voi ehkäistä?

- Kondomin käyttö emätin- ja anaaliyhdyntäessä ehkäisee seksitauteja tehokkaasti.
- Anaaliyhdyntäessä tulee kondomin kanssa käyttää aina vesiliukoista tai silikonipohjaista liukuvoidetta.
- Suuseksissä seksitaudeilta voi suojautua kondomilla tai suuseksisuojaalla.
- Säännöllinen seksitautitesteissä käyminen on hyvä tapa huolehtia omasta terveydestä ja ehkäistä uusia tartuntoja.
- Prep-lääkitys ehkäisee hiv-tartuntoja tehokkaasti.



Tikkunäyte nielusta
• klamydia ja tippuri

Suoniverinäyte
• kuppa
• hiv

Sormenpään verinäyte
• hiv

Tikkunäyte peräaukosta
• klamydia ja tippuri

Virtsanäyte
• klamydia ja tippuri

	Klamydia	Tippuri	Kuppa	Hiv	Kondylooma	Herpes
Milloin testiin?	5 vuorokautta suojaamattoman seksin jälkeen	5 vuorokautta suojaamattoman seksin jälkeen	3 viikkoa suojaamattoman seksin jälkeen Negatiivinen tulos on luotettava 6 viikon jälkeen.	3 viikkoa suojaamattoman seksin jälkeen Negatiivinen tulos on luotettava 12 viikon jälkeen.	Oireiden perusteella	Oireiden perusteella
Miten todetaan?	Virtsanäyte, tikkunäyte nielusta tai peräaukosta (tikkunäyte virtsaputken suulta tai emättimestä)	Virtsanäyte, tikkunäyte nielusta tai peräaukosta (tikkunäyte virtsaputken suulta tai emättimestä)	Verinäyte	Verinäyte	Syylämäiset ihomuutokset sukuelinten, suun tai peräaukon alueella	Rakkulat sukuelinten, suun tai peräaukon alueella
Miten hoidetaan?	Suun kautta otettava antibioottilääkitys	Yleisimmin pistoksen ja suun kautta otettavan antibiootin yhdistelmähoito	Lihakseen pistettävä antibiootti	Jatkuva suun kautta otettava lääkitys tai pistoshoito	Syyliä voidaan hoitaa lääkepenslauksella, jäädytyshoidolla tai laserilla.	Viruslääkkeillä voidaan hoitaa ja ennaltaehkäistä oireita ja vähentää tartuttavuutta.
Miten parantuu?	Parantuu lääkityksellä kokonaan.	Parantuu lääkityksellä kokonaan.	Parantuu lääkityksellä kokonaan.	Täysin parantavaa hoitoa ei ole. Hiv-lääkitys pitää tartunnan saaneen terveenä ja estää hivin tarttumisen.	Täysin parantavaa hoitoa ei ole. Paranee usein itsestään ajan kanssa.	Täysin parantavaa hoitoa ei ole. On yleensä suurimman osan aikaa oireeton.

Minne testiin?

Seksitautitesteihin pääsee ilmaiseksi omalla terveysasemalla, sukupuolitautien poliklinikalla ja opiskelijaterveydenhuollossa.

Ilmaiseen ja nimettömään hiv-pikatestiin pääsee Hivpointissa.

Kaipaatko lisätietoa seksitaudeista?

Vieraile osoitteessa hivpoint.fi

Tai seuraa meitä somessa!



Seksitautitartunnat on hyvä löytää ajoissa ja hoitaa ohjeiden mukaan, jotta niistä ei aiheudu vakavia terveysongelmia.