



Miten hiviä hoidetaan?

Säännöllinen hiv-lääkitys pitää tartunnan saaneen terveenä ja estää hivin tarttumisen. Lääkehoito on maksuton.



Mikä on PREP?

Prep on hiviä tehokkaasti ennaltaehkäisevä maksuton lääkehoito. Sitä käytetään päivittäin tai tarpeen mukaan.



Mikä on PEP?

Pep on hivin jälki-ehkäisyyn tarkoitettu maksuton lääkehoito. Pep-lääkehoito on aloitettava mahdollisimman pian, viimeistään 72 tunnin sisällä riskitilanteesta.

Älä syrji hiv-positiivisia



Huolehdi, että sinulla on oikeaa tietoa hivistä.

Lisätietoa hivin ennaltaehkäisystä ja hoidosta: hivpoint.fi

Tietoa huumehaittojen vähentämisestä: paihdelinkki.fi


Vertaistukea hivin kanssa eläville: positiiviset.fi



A-klinikkasäätiö



Hiv-testaus, ennaltaehkäisy ja hoito



Hiv-pikatesti on luotettava ja nopea tapa selvittää, onko sinulla hiv-tartunta.

! Miten hiv voi tarttua?



1. emätin- ja anaaliyhdyntäessä ilman kondomia
2. pistosvälineiden yhteiskäytössä
3. Suuseksissä on hyvin pieni hivin tartuntariski sillä osapuolella, joka saa siemennestettä, esiliukastetta tai emätineritettä suuhunsa.
4. Hiv voi tarttua sikiöön raskauden aikana silloin, kun raskaana oleva ei ole hiv-lääkityksellä.


✓ Miten hiv ei tartu?



Hiv ei tartu arkisessa kanssakäymisessä, kuten halauksissa, suutelemisessä, kättelyssä, wc-tiloista, eikä syljen, hien tai virtsan kautta.

Hiv ei voi tarttua toimivalla hiv-lääkityksellä olevalta henkilöltä seksissä.

Miten hiviä ennaltaehkäistään?



1. säännöllinen hiv-testaus 3 kk välein



2. omat pistosvälineet



3. kondomi ja liukuvoide



4. hiv-positiivisen hiv-lääkehoito
prep - hivin ennaltaehkäisy-lääkitys
pep - hivin jälkiehkäisy-lääkitys